

一、什麼是疝氣？

疝氣及陰囊水腫都是由於位於腹股溝內之腹膜突出囊袋未閉合，使得腹腔內的水或是腸子充滿於袋內所形成。

二、為何需要這種治療：

尤其小腸掉落所形成之疝氣，如不提早治療，可能會發生嵌入性疝氣，造成腸壞死，此因應即早進行手術。

三、手術如何進行：

- (1)手術必須全身麻醉。
- (2)醫師會由下腹作一小橫切口，找出精索及疝氣袋後將疝氣袋切除。
- (3)皮膚也會作皮下縫合，不須拆線也不須換藥。

三、手術後應注意事項有哪些：

- (1)手術後會有些微疼痛，大部分兒童均能忍受。
- (2)為防止傷口發炎，請按時服藥。
- (3)如有輕微陰囊紅腫現象，是因為剝除疝氣袋後組織腫脹的正常現象，無須緊張，三、五天內即可消除。

四、應該如何繼續追蹤及治療：

- (1)手術後無須換藥，沐浴時勿弄濕傷口，請保持傷口乾燥，但如傷口滲血或膠布脫落，應立即返院治療。
- (2)你第一次返院時間為出院一週後。醫師同時會將縫線拆除。

<如有任何需要及問題歡迎詢問護理人員>

祝您健康平安！