

一、為何需要這種治療：

尿道開口於正常位置下方，稱之尿道下裂，爲了使尿道開口於正常位置，使陰莖變直，以便正常直立排尿及射精，必須以手術修正之。

二、如何進行手術：

- (1)手術最好在 3 歲左右進行。
- (2)全身麻醉是必需的。
- (3)醫生會以包皮製作成新的尿道，接合於下端開口及龜頭之間，同時清除彎曲的纖維組織，使陰莖變直。
- (4)手術後會有導尿管(由陰莖或由下腹部開口)留置一週左右。

三、手術後應注意事項：

- (1)應盡量避免小孩亂動或哭鬧，否則可能會使尿液外漏，影響傷口復原。
- (2)注意尿管是否通暢，以免漲尿後由傷口排尿，影響結果。
- (3)術後三天內傷口包紮是爲了壓迫傷口，防止血腫，應注意有無脫落，如有脫落請立即請醫護人員檢視。
- (4)傷口感染及血腫容易產生尿道瘻管，有部分手術會因此失敗，必須等半年後再行修補手術。

四、出院後應如何追蹤及治療：

- (1)你第一次返院門診時間爲一週後。
- (2)平時在家裡應在排尿後以優點藥水擦拭傷口，保持傷口清潔乾燥，以防感染。
- (3)如有尿道瘻管產生，請勿灰心，應依醫生指示於適當時機返院作瘻管修補術。
- (4)宜按時服藥，可減緩傷口疼痛及預防傷口感染。

<如有任何需要及問題歡迎詢問護理人員>

祝您健康平安！