

一、為何需要這種治療：

你或你的孩子因包皮過長，或者常常引發龜頭包皮炎時，醫師會建議進行包皮環切手術。

二、手術如何進行：

- (1)這是一個簡單的手術，15歲以上的人只需要局部麻醉即可，但15歲以下的孩子如無法忍受疼痛，仍須以全身麻醉進行。
- (2)包皮多餘部份分作上下兩個環狀切開後，將兩環之間的皮剝掉再以羊腸線縫合即可。

三、手術後有那些問題：

- (1)小兒手術後因傷口疼痛時有哭鬧，應避免其扯落包紮之紗布。
- (2)如小兒解尿時弄濕傷口，應重新換藥消毒。
- (3)術後如有輕微出血，可以紗布壓迫止血，或以手指壓迫15-20分鐘以達止血目的。
- (4)如果無法止血，應立即帶至本院急診。

四、出院後應注意事項有那些：

- (1)現在使用的縫線均不需拆線，約一週後即可掉落。
- (2)手術後傷口前方包皮會有輕微血腫瘀青，乃正常現象，請勿驚慌，約二週內可完全消失。

五、如何繼續追蹤檢查及治療：

- (1)第一次返院治療時間: -----月-----日----- 午門診。
- (2)請定時服藥，以避免傷口感染。
- (3)如傷口紗布脫落請自行以優碘藥水擦傷口，並包紮。

<如有任何需要及問題歡迎詢問護理人員>

祝你健康平安!