

一、何謂腎盂輸尿管狹窄?

當腎盂輸尿管交接處有先天性或外因性狹窄，導致腎臟水腫，會影響腎功能。

二、手術時機

影響腎功能時必須手術加以修正，使之寬闊通暢。

三、如何進行手術：

- (1)手術必須全身麻醉。
- (2)由腰部切入後腹腔。
- (3)分離出腎盂及輸尿管。
- (4)將多餘的腎盂及狹窄的輸尿管切除後再將輸尿管接於腎盂上。

四、手術後應注意事項：

- (1)手術後會置放腎臟引流管及傷口引流管。
- (2)術後會有輕微血尿，約二至三日內會自然消失。
- (3)傷口復原時間約 10~14 天，醫師會進行逆行性腎盂攝影，證明新交接處無漏尿之虞，即可拔除腎臟引流管。
- (4)手術後應注意腎臟引流管有無通暢，如有腰痛應請醫師診視。

五、如何追蹤及治療：

- (1)您第一次返院門診時間為一週後。
- (2)您必須每週檢查一次尿液，直到無尿路感染跡象為止。
- (3)至少在手術後三個月內都需要服抗生素藥物。
- (4)多喝開水，多休息，並依醫囑進行必要的檢查，如有發燒、腰痛應即返院治療。

<如有任何需要及問題歡迎詢問護理人員>

祝您健康平安！