

### **一、為何需要這種治療：**

當你的精索靜脈曲張，產生睪丸疼痛，或因為局部溫度太高，影響到你的精蟲品質，導致不孕症，醫師將施行靜脈結紮術，以矯正這種問題。

### **二、手術如何進行：**

- (1)手術必須半身麻醉。
- (2)我們將由你的左下腹作一橫向切口，大約三公分長。
- (3)我們會從你的後腹腔，找出精索靜脈。
- (4)將精索靜脈結紮分離。
- (5)縫合傷口完成手術。

### **三、手術後有那些問題：**

- (1)手術後會有輕微的傷口疼痛，必須忍耐或服用止痛藥物。
- (2)手術後你的左側精索靜脈，將不會立即消失，大約會等三個月後側枝循環生長完之後，才會完全消失。
- (3)有百分之三十的病人可能不會消失，可是對於局部的症狀，仍然會有緩解的效果。

### **四、出院後應注意事項有那些：**

- (1)出院後並不須換藥，可在手術後第七天返院拆線。
- (2)儘量多休息，三週內勿作劇烈活動，如打球、跑步，並按時服藥。
- (3)如果有傷口有紅、腫、疼痛及異常分泌物等情形，請立即返院治療。

### **五、如何繼續追蹤檢查及治療：**

- (1)你第一次返院門診時間為一週後。
- (2)依醫師指示返院接受檢查以及精蟲分析。

**祝你健康平安!**