

一、簡介

電燒是一種婦產科治療疾病的手術名稱。

二、適應症

包括尖性濕疣、尿道肉阜、子宮頸糜爛等。

三、術前準備項目

- 1.填寫手術及麻醉同意書。
- 2.手術前一天晚上 12 點後禁食。

四、術後注意事項

- 1.術後 1-2 天有輕微出血及疼痛情形。
- 2.保持患部的乾燥及清潔。
- 3.患部的結痂會再 2-3 天自然脫落。
- 4.在 4-6 週之內水性分泌物會增加。
- 5.勿行使陰道沖洗、性交或置陰道棉條需等一個月後或分泌物完全乾淨後。
- 6.按時服藥，必要時可在術後 2-3 天內坐浴每次 15 分鐘，以減輕患部腫脹疼痛。
- 7.按照醫師與你約定的時間回診。

五、傷口護理

- 1.手術後會有少量出血，因此於陰道內會塞紗布 1 塊，手術後必須依醫師指示的時間將陰道內之紗布塊取出。
- 2.保持患部之乾燥清潔，如廁後用清水沖洗再塗藥膏即可
- 3.手術傷口的結痂會在 2~3 天自然脫落，多，應立即就醫。
- 4.手術後四週內會有水狀之分泌物，可使用衛生護墊。
- 5.治療一個月內勿行陰道沖洗及置放陰道棉條。
- 6.手術後回診，待醫師診視確認手術傷口。
- 7.請於一個月治療期間內，依醫師指示回診。

六、活動：手術當天需臥床休息，待較為舒適如無噁心後，可恢復正常活動。

七、飲食：手術後約一小時，可以先進食少量開水果汁、牛奶、稀飯)。
24 小時內請勿進食含酒精性之飲食、飲料。

八、服藥：請依醫師指示服藥。

九、若有下列徵象，請立即就醫：

- 1.陰道大量出血(比月經還多)。
- 2.體溫超過 38°C 以上。
- 3.頻尿或小便有灼熱感。
- 4.持續性噁心感或嘔吐，未改善。