



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	凝血酶原時間/Prothrombin Time	
醫令代碼	080260000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 含 3.2% sodium citrate 之 真空採血管。	檢體量： 全血量與 sodium citrate 成 9:1 之比例(至透明白線)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	- 不良檢體:檢體少於或多於標記之透明白線、溶血達 2+以上、檢體凝固、檢體存放超過 4 小時未檢測、病人資料不符，皆以退件重新採檢處理。 - 患者 Hct>55%。	
檢驗操作方法/儀器	凝固法/CS-1600	
可送檢時間	24 小時	
報告完成時間	急件：1小時。	
檢驗效能/干擾	- 檢驗效能 AMR:0~1800sec. - 干擾 溶血、凝血及脂血。	
檢體運送及保存方式	- 檢體運送:室溫。 - 當日離心後檢體室溫可存放 4 小時。 - 血漿在-20℃可保存兩週。 - 血漿在-70℃可保存6個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:08026C 給付點數:150點 自費價格:195元	
生物參考區間	1. PT參考範圍:9.9~11.6 sec.	

(包含臨危值通報)	INR治療範圍:一般為2.0~4.0，實際範圍依醫師治療狀況而定。 2. 臨危值 INR $\geq$ 3.5
臨床意義與用途： 可用於篩選先天性外在路徑(Extrinsic pathway)凝血因子缺乏，肝功能及口服抗凝劑之監測。PT 增加：先天性血液凝固因子 II、V、VII、X 缺乏、DIC、維他命 K 缺乏、肝功能異常及服用口服抗凝劑；PT 降低：多發性骨髓瘤、急性血栓靜脈炎、服用維他命 K。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1. 自行操作 2. 可接受委託檢驗	