



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/04/01

檢驗項目(中文/英文)	輸血反應探測 / Investigation transfusion reaction
醫令代碼	110110000001 110110000002(急做)
檢體類別	Blood、Urine
採檢容器及檢體量	 BCS tube 3 mL 1 管  EDTA tube 3 mL 2 管  PT、APTT tube 3 mL 1 管  Plain tube 8 mL 2 管  Blood culture 一套  尿管 10 mL 1 管
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.將有反應之血袋連同輸血用具送回血庫 2.注意檢體是否溶血，若有溶血則重新採檢 3.EDTA tube 其中一管及 Plain tube 需有抽血者與核對者雙重核對
檢驗操作方法/儀器	綜合性檢查
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	14 天
檢驗效能/干擾	為輸血過程中產生不適症狀，依照輸血反應單執行各項檢查
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:常溫運送 2. 保存方式:操作完後於 1~6°C 冷藏保存
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血庫組/分機 4300

健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保碼：11011B 健保(點)：500 自費(元)：560
生物參考區間 (包含臨危值通報)	無
臨床意義與用途： 病人疑有輸血反應進行之探討，綜合檢驗結果由醫師判斷並給予建議，以防止病人下次輸血發生輸血反應，確保病人輸血安全。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1.一、二級輸血反只需送輸血反應通知單，三級輸血反應則由醫師評估是否開立輸血反應探測 連同通知單 2.自行操作，不接受委託及委外操作	