



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/12/22

| | |
|-------------------------------|---|
| 檢驗項目(中文/英文) | 輸血反應探測 / Investigation transfusion reaction |
| 醫令代碼 | 1101110000001 1101110000002(急做) |
| 檢體類別 | Blood、Urine |
| 採檢容器及檢體量 |  BCS tube 3 mL 1 管  EDTA tube 3 mL 2 管  PT、APTT tube 3 mL 1 管  Plain tube 8 mL 2 管   Blood culture 一套  尿管 10 mL 1 管 |
| 採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準) | 1. 將有反應之血袋連同輸血用具送回血庫 2. 注意檢體是否溶血，若有溶血則重新採檢 3. EDTA tube 其中一管及 Plain tube 需有抽血者與核對者雙重核對 |
| 檢驗操作方法/儀器 | 綜合性檢查 |
| 可送檢時間 | 24 小時 |
| 報告完成時間 | 14 天 |
| 檢驗效能/干擾 | 為輸血過程中產生不適症狀，依照輸血反應單執行各項檢查 |
| 檢體運送及保存方式 | 1. 檢體運送：室溫運送 2. 保存方式：操作完後於 1~6°C 冷藏保存 |
| 操作組別/ 檢驗諮詢分機 | 血庫組/分機 4300 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| 健保代碼/給付點數/ 自費價格 | 健保碼：11011B 健保(點)：500 自費(元)：560 |
| 生物參考區間 (包含臨危值通報) | 無 |
| 臨床意義與用途： | |
| 病人疑有輸血反應進行之探討，綜合檢驗結果由醫師判斷並給予建議，以防止病人下次輸血發生輸血反應，確保病人輸血安全。 | |
| 備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) | |
| 1.一、二級輸血反只需送輸血反應通知單，三級輸血反應則由醫師評估是否開立輸血反應探測連同通知單 2.自行操作，不接受委託及委外操作 | |