



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/31

檢驗項目(中文/英文)	抗核抗體/ANA (antinuclear antibody)	
醫令代碼	1205300000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量		橘黃管 2 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.嚴重溶血、黃疸、脂血的受檢者血清應避免使用 2.溶血$\geq 3+$者應重抽	
檢驗操作方法/儀器	Indirect Immunofluorescence assay (IFA)/ Helios IFA / REF.IOS-1000	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 個工作天	
檢驗效能/干擾	明顯溶血、污染、或混濁的檢體不可使用。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:冰浴運送。 保存方式: 1.冷藏 2-8°C可保存 48 小時。 2.冷凍-20°C可永久保存。	

操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12053C/330(自費價格 429 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative : <1:80 (-) AC-0 Positive : $\geq 1:80$ AC(1~29)。 臨危值通報: 無。
臨床意義與用途： ANA 檢測主要用於臨床鑑別各種自體免疫疾病，包括括 systemic lupus erythematosus(SLE) 、 Progressive systemic sclerosis、混合性結締組織疾病(Mixed connective tissue disease；MCTD)、乾燥綜合徵（SS）、 Polymyositis Dermatomyositis and rheumatoid arthritis 。利用 ANA 對自體免疫疾病之臨床特異性來做為自體免疫疾病初步篩檢的指標。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 可自行操作/可接受委託檢驗	