



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/11/01

檢驗項目(中文/英文)	抗Centromere抗體/ Anti-Centromere antibody	
醫令代碼	121740000004	
檢體類別	血清或血漿	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	血清或血漿，不需空腹，無收集時間限制。靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血清或血漿。	
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 工作天	
檢驗效能/干擾	無。	
檢體運送及保存方式	檢體運送：常溫 保存方式： 1.血清/血漿室溫可保存 8 小時。 2.血清/血漿冷藏(2-8°C)可保存二星期。 3.血清/血漿冷凍-20°C 可長期保存。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12064B/561 點(檢驗 Ro/La/Ce 自費價格 729 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative <7 IU/ml 臨危值通報:無。	

臨床意義與用途：

抗核抗體(ANA)的測定對於結締組織疾病的臨床診斷極為重要。CENP 抗體於 70-90 % CREST 症候群患者身上發現，局限型相較上具有較好的預後。然而，其也可能於雷諾氏症候群(Raynaud's disease)和原發性膽汁肝硬化(Primary Biliary Cirrhosis)的患者身上驗出(約 10-20 %)。操作流程限制：不可僅憑任一個單一診斷方法之結果做為臨床診斷的依據，只可在所有臨床和實驗室結果都經評估後由醫師做出。期望值：自體免疫疾病病人的抗體盛行率依疾病別而有很大差異，以本產品測定正常族群之血清，CENP 抗體的陽性率低於 1%，期望值可

能因為測定的目標族群不同而有很大差異。

備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)
可自行操作/可接受委託檢驗。