




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/01/07

檢驗項目(中文/英文)	抗核抗體/ANA (antinuclear antibody)	
醫令代碼	120530000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量		SST tube (含 gel) 橘黃管 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	採檢容器：血清分離用促凝劑與分離膠之 真空採血試管(黃頭)	
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.嚴重溶血、黃疸、脂血的受檢者血清應避免使用 2.溶血 $\geq 3+$ 者應重抽	
檢驗操作方法/儀器	Indirect Immunofluorescence assay (IFA)/ Helios IFA	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	7 個工作天	
檢驗效能/干擾	明顯溶血、污染、或混濁的檢體不可使用。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫送檢。 保存方式： 1.冷藏 2-8°C可保存 48 小時。 2.冷凍-20°C可保存更長時間。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12053C/330(自費價格429元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative： $< 1:80$ (-) AC-0 Positive： $\geq 1:80$ AC(1~29) 臨危值通報：無。	
臨床意義與用途：	ANA 檢測主要用於臨床鑑別各種自體免疫疾病，包括 systemic lupus erythematosus(SLE)、Progressive systemic sclerosis、混合性結締組織疾病(Mixed connective tissue disease；MCTD)、乾燥綜合徵(SS)、Polymyositis Dermatomyositis and rheumatoid arthritis。利用 ANA 對自體免疫疾病之臨床特異性來做為自體免疫疾病初步篩檢的指標。	
備註：	(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)	

