



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：115/01/08

檢驗項目(中文/英文)	抗RNA Pol III 抗體/Anti- RNA Pol III antibody
醫令代碼	121740000002
檢體類別	血清或血漿
採檢容器及檢體量	橘黃管單項量 3 ml 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	可用血清或血漿(肝素、檸檬酸、EDTA)檢體進行檢驗，有脂血、溶血或微生物污染情形的檢體可能使測定結果不佳，不應使用。
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	7工作天
檢驗效能/干擾	無。
檢體運送及保存方式	<p>檢體運送條件：室溫運送</p> <p>檢體保存方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 血清/血漿放置於室溫下不可超過8小時。</li> <li>2. 血清/血漿可冷藏儲存於2-8°C兩個星期而沒有降解表示未受到細菌或黴菌污染。</li> <li>3. 血清/血漿若需長期保存應冷凍儲存於-20°C或更低的溫度。</li> </ol>
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	比照 12174B /507 點(自費價格 659 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	<p>Negative : &lt;7 U/ml。</p> <p>臨危值通報:無。</p>
臨床意義與用途：	<p>PM-Scl抗體於約24%的多發性肌炎/硬皮症重疊症候群 (polymyositis/scleroderma (PM/SSc) overlap syndrome)病人、約8% 的多發性肌炎和約3% 的硬皮症患者發現6,7。PM-Scl抗體對此疾病族群具有高度特異性，PM-Scl 75和PM-Scl 100此2個抗原被視為這些抗體的目標。然而，實際上所有與PM-Scl 75反應的抗體也會與PM-Scl 100反應8。多發性肌炎/硬皮症重疊症候群與良性和慢性的病程較為相關，低至中劑量的皮質固醇 (corticosteroids) 治療即有反應。出現PM-Scl抗體可預測有局部皮膚受侵犯6,7。</p>
備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)	<p>可自行操作/可接受委託檢驗。</p>