



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/09/08

檢驗項目(中文/英文)	抗CENP抗體/ Anti-CENP antibody
醫令代碼	121740000004
檢體類別	血清或血漿
採檢容器及檢體量	橘黃管單項量 3 ml 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	可用血清或血漿(肝素、檸檬酸、EDTA)檢體進行檢驗，有脂血、溶血或微生物汙染情形的檢體可能使測定結果不佳，不應使用。
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	7工作天
檢驗效能/干擾	無。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式： 1.血清/血漿放置於室溫下不可超過 8 小時。 2.血清/血漿可冷藏儲存於 2-8°C 兩個星期而沒有降解表示未受到細菌或 黴菌污染。 3.血清/血漿若需長期保存應冷凍儲存於 -20°C 或更低的溫度。 4.避免反覆冷凍和解凍。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12064B/561 點(檢驗 Ro/La/Ce 自費價格 729 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative : <7 U/ml 臨危值通報:無。
臨床意義與用途：	抗核抗體(ANA)的測定對於結締組織疾病的臨床診斷極為重要。CENP抗體於 70-90 % CREST症候群患者身上發現，局限型相較上具有較好的預後。然而，其也可能於雷諾氏症候群(Raynaud's disease)和原發性膽汁肝硬化(Primary Biliary Cirrhosis)的患者身上驗出(約 10-20 %)。
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)	可自行操作/可接受委託檢驗。