



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/01/08

檢驗項目(中文/英文)	抗Ro抗體/ Anti-Ro antibody
醫令代碼	120640000001
檢體類別	血清或血漿
採檢容器及檢體量	橘黃管單項量 3 ml 
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	可用血清或血漿(肝素、檸檬酸、EDTA)檢體進行檢驗，有脂血、溶血或微生物污染情形的檢體可能使測定結果不佳，不應使用。
檢驗操作方法/儀器	FEIA/Phadia250
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	7工作天
檢驗效能/干擾	無。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式： 1. 血清/血漿放置於室溫下不可超過8小時。 2. 血清/血漿可冷藏儲存於2-8°C兩個星期而沒有降解表示未受到細菌或黴菌污染。 3. 血清/血漿若需長期保存應冷凍儲存於-20°C或更低的溫度。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12064B/561 點(檢驗 Ro/La/Ce 自費價格 729 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative : <7 U/ml。 臨危值通報:無。
臨床意義與用途：	抗核抗體(ANA)的測定對於結締組織疾病的臨床診斷極為重要。檢測 SS-A/Ro 抗體對於全身紅斑性狼瘡 (systemic lupus erythematosus, SLE) (盛行率 40-50 %)和薛格連氏症候群(Sjögren's syndrome) (對於原發性薛格連氏症候群的盛行率為 60-75 %)的臨床診斷有其重要性及意義。研究指出其與某些疾病的次分類有很緊密的關聯，像是亞急性皮膚性紅斑性狼瘡(subacute cutaneous LE)、新生兒紅斑性狼瘡(neonatal lupus erythematosus)或薛格連氏症候群的血管炎 (vasculitis in Sjögren's syndrome)。抗 SS-A/Ro 可能是唯一會出現於全身紅斑性狼瘡或薛格連氏症候群患者的抗體，若無法評估抗 SS-A/Ro 於診斷上會造成其他檢測法無法彌補的漏洞。
備註:(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)	可自行操作/可接受委託檢驗。