



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114.10.30

檢驗項目(中文/英文)	EBV 病毒核酸定量；EBV Viral load
醫令代碼	121840000005
檢體類別	血漿 Plasma
採檢容器及檢體量	 <p>EDTA 大紫頭管 8ml</p>
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	採檢注意事項：採檢後立即將檢體以室溫(25°C)傳送(不可超過 24 小時) 退件標準：(A)檢體少於 5mL、(B)檢體 clot、(C)冷凍之檢體
檢驗操作方法/儀器	Real-Time PCR / Roche cobas 5800
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00 / 於每週一操作
報告完成時間	7 個工作天
檢驗效能/干擾	<p>檢驗效能：</p> <p>AMR：35.0~1.0x10⁸ IU/mL</p> <p>CRR：1、Target Not Detected 2、<35 IU/mL 3、35.0~1.0x10⁸ IU/mL 4、>1.0x10⁸ IU/mL</p> <p>干擾物質： 避免嚴重溶血。</p>
檢體運送及保存方式	<p>檢體運送：室溫。</p> <p>保存方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 血漿分裝後，於 25°C 可保存 24 小時。 2. 於 2°C 到 8°C 保存達 72 小時或 ≤ -18°C 達 6 星期。 3. 分離並保存於分裝管的血漿檢體在 ≤ -18°C，最多可經三次循環的解凍/冷凍程序，仍保持穩定性。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	分子診斷組/4318

健保代碼/給付點數/ 自費價格	12184C /2000 點 (自費金額：2600 元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Target Not Detected .
<p>Epstein-Barr 病毒 (EBV)，也被稱為人類皰疹病毒第四型 (HHV-4)，是在人類中最常見的病毒之一。EBV 是一種嗜淋巴球細胞，為一種有囊鞘膜的雙鏈 DNA 病毒。該病毒主要通過唾液傳播，然而經性行為傳染、移植或含淋巴細胞的血液製品所造成的感染也已被證實。</p>	
<p>備註：本院自行操作，可接受委託檢驗</p>	