




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/01/31

檢驗項目(中文/英文)	C-Peptide；C-胜鏈胰島素免疫分析	
醫令代碼	091280000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	血清，需空腹 8 小時以上，無收集時間限制。 靜脈採血，血液完全凝固後，離心分離出血。	
檢驗操作方法/儀器	化學冷光微粒免疫分析技術（CMIA）/ABBOTT /Alinity i	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	3 工作天	
檢驗效能/干擾	具溶血、黃疸 (icterus)、脂血或微生物汙染的受檢者血清應避免使用。	
檢體運送及保存方式	檢體運送:常溫立即送檢 保存方式:室溫不可超 8 小時，2~8℃可保存兩個星期。 若無法在兩個星期內檢驗，檢體應保存於- 20℃。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09128C/180 點(自費價格 234 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	0.78-5.19 ng/mL 臨危值通報:無。	
臨床意義與用途： 胰島素（insulin）在醣類代謝中扮演著重要的角色，前胰島素（proinsulin）經蛋白酶裂解形成胰島素與C-胜肽（C-Peptide）。胰島素治療可能會引發體內產生胰島素抗體（insulin antibody），影響到胰島素之檢驗，而C-Peptide檢驗不會受到胰島素抗體的干擾，因此可以真實檢驗出病人胰島素分泌之狀況。		
備註:自行操作、可接受委託檢驗		