



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院服務資訊

更新日期：113/1/31

檢驗項目(中文/英文)	CK
醫令代碼	090320000001、090320000002
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	黃頭管或綠頭管(lithium heparin)2mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	不建議使用含有EDTA、草酸或檸檬酸的血漿檢體。
檢驗操作方法/儀器	AU5800/DXC700AU
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時內完成 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	檢體離心後須確認無fibrin以免影響報告結果。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式：冷藏2-8°C可保存8-12 小時。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09032C/70/91
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間：30-223U/L。
臨床意義與用途： 肌酸激酶的測定數據用於心肌梗塞〈myocardialinfarction〉和肌肉疾病的診斷和治療，如裘馨氏肌肉萎縮症(DuchenneMuscularDystrophy)。肌酸激酶(CK)是主要存在於骨骼肌、心肌、和腦組織的酶。提高的CK的水平與心肌梗死和各種肌肉疾病有關。在心肌梗塞時，CK值會在胸痛發生後的24-36 小時內出現高峰，且根據損壞程度其值可以高於正常值的十倍以上。	
備註：本院自行操作,可接受委託檢驗	