



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113.01.31

檢驗項目(中文/英文)	CRP
醫令代碼	120150000001、120150000002
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	2mL 黃頭管或綠頭管
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1. 檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果 2. 脂血, 溶血, 黃疸檢體會影響報告結果
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送 檢體保存方式:冷藏 2-8°C 4 天
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12015C/275/358
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間:0-0.1 mg/dL(1.00~5.00 mg/dL 輕微發炎, 5.00~10.00 mg/dL 中等程度發炎 and >10.00 mg/dL較嚴重之發炎或細菌感染。心血管風險評估: 低風險: <0.10 mg/dL;中度風險: 0.10~0.30 mg/dL;高風險: >0.30 mg/dL。) 。

臨床意義與用途：

常規應用：血清中的 C-反應蛋白會於心肌梗塞，壓力，外傷，感染，炎症，手術，或腫瘤擴散發生後 24 至 48 小時內大幅上升，並可能會是正常值的 2000 倍。因為 CRP 上升是非特異性的，必須搭配其他心臟疾病的專一性測試，例如總膽固醇，高密度脂蛋白膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇。因此，若沒有一個完整的臨床病史，則無法被單獨的判讀，僅能與以前的值相比。

備註:本院自行操作,可接受委託檢驗

E6A0021968-G2