



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：113/01/31

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 檢驗項目(中文/英文)                   | 嗎啡/Morphine  |
| 醫令代碼                          | 108010000001   |
| 檢體類別                          | Urine  |
| 採檢容器及檢體量                      | 白蓋尖底管 10mL   |
| 採檢注意事項<br>(包含影響檢驗性能、<br>退件標準) | 收集尿液檢體於乾淨的容器中。不需添加任何防腐劑。   |
| 檢驗操作方法/儀器                     | 快篩   |
| 可送檢時間                         | 24 小時  |
| 報告完成時間                        | 常規：4 小時內完成<br>急件：1 小時  |
| 檢驗效能/干擾                       | 檢驗之前必須將冷藏的尿液檢體回溫到室溫。若檢體中有沈澱物應過濾、離心或者靜置，取其澄清液測試。回溫之尿液檢體應馬上檢驗。   |
| 檢體運送及保存方式                     | 檢體運送：常溫立即送檢<br>保存方式：冷藏於 2-8°C 可保存 48 小時  |
| 操作組別/<br>檢驗諮詢分機               | 生化組(4301)  |
| 健保代碼/給付點數/<br>自費價格            | 10811B/250/325   |
| 生物參考區間<br>(包含臨危值通報)           | Negative。  |
| 臨床意義與用途：                      | 嗎啡與海洛英(heroin)、鴉片(opiates)、可待因(codeine)一樣都是中樞神經抑制劑。使用高劑量的鴉片會產生興快感、釋放焦慮感。濫用者會顯著的成癮性且導致協調性降低、中斷判斷、呼吸次數減少、貧血及昏迷。海洛因在體內快速代謝出嗎啡及其尿苷酸產物(morphine glucuronide)、6-乙醯嗎啡(6-caetylmorphine)等。當尿液檢體中出現嗎啡及其代謝物質，表示吸食海洛因、嗎啡及/或可待因。 |
| 備註:                           | 本院自行操作,可接受委託檢驗   |