



台中慈濟醫院 乳房醫學中心



醫病共享決策輔助評估表

姓 名：_____

病歷號：_____

年 齡：_____

我是個停經後賀爾蒙接受體陽性且HER2陰性之
轉移性乳癌患者，但沒有肝、肺、腦轉移，
我該選何種抗荷爾蒙療法？



【此評估表不適用於考慮使用CDK4/6 inhibitor之患者】

前言

乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45-69歲之間，約為每十萬名婦女188-194人。依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示，女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為69.1及12.0（每十萬人口），每年有逾萬位婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。

相較於西方人，台灣乳癌病患者有年輕化及高比率荷爾蒙陽性的特性，因此，能增加病患治療多樣性、延續性，且對於延長總體存活期有潛在好處的抗荷爾蒙治療是台灣乳癌病患所急需的。



步驟1 | 我是哪一型乳癌？

荷爾蒙激素受體	HER2	Ki67	類型	比例	治療策略
荷爾蒙激素受體陽性 ER(+) PR(+)	HER2 陰性 HER2 (-)	Ki67 <20%	管腔 A 型 Luminal A	約 40%	荷爾蒙療法
		Ki67 >20%	管腔 B1 型 Luminal B1	約 20%	荷爾蒙治療 ± 化學治療
	HER2 陽性 HER2 (+)	管腔 B2 型 Luminal B2	荷爾蒙治療 + 標靶治療 + 化學治療		



停經後
國語版



停經後
台語版



步驟2 | 當我面臨必須接受抗荷爾蒙藥物時，該如何選擇？

+ 停經前婦女

抗雌激素製劑 (Tamoxifen) 搭配停經針使用或切除雙側卵巢

經由停經針使用或切除雙側卵巢進入停經狀態後，建議以停經後婦女治療選擇為主，以增加治療效果。

+ 停經後婦女


芳香環酶抑制劑 (Aromatase inhibitors, AIs)

復乳納 (Femara)、安美達 (Arimidex)、諾曼癌素 (Aromasin)。

法洛德注射液 (Fulvestrant)

根據臨床研究 500 mg 療效大於 250 mg。

第三期臨床試驗 FALCON 試驗所納入的晚期乳癌病人未曾接受過賀爾蒙治療，結果顯示，在非內臟器官轉移之患者，法洛德注射液 (Fulvestrant) 組的疾病穩定存活期 (PFS) 為 22.3 個月，芳香環酶抑制劑 (AI) 組為 13.8 個月，可延長 8.5 個月的疾病穩定存活期。



芳香環酶抑制劑
Aromatic cyclic enzyme inhibitor

法洛德注射液
Fulvestra 500 mg

復乳納



安美達錠



諾曼癌素





步驟3 | 您在選擇抗賀爾蒙治療方式之前，最在意的因素有什麼？

因您在意的和醫學上的考量同等重要!!!!

🔍 請您仔細想一想，請完成下列圖示之勾選，麻煩您！

接下來請試著去圈選下面會影響您治療的考量因素

0分代表對您不重要，5分代表對您非常重要

考量因素	不重要	較不重要	普通	重要	很重要	非常重要
藥物使用方便性	0	1	2	3	4	5
藥物造成之疼痛感	0	1	2	3	4	5
藥效長短	0	1	2	3	4	5
藥物療效	0	1	2	3	4	5
藥物副作用	0	1	2	3	4	5
存活期	0	1	2	3	4	5
復發率	0	1	2	3	4	5
臨床效益	0	1	2	3	4	5





步驟4 | 您是否已清楚瞭解芳香環酶抑制劑 (AI) 及法洛德注射液 (Fulvestrant) 之優缺點呢？

? 請您試著回答下列問題

- 1 接受法洛德注射液 (Fulvestrant) 較芳香環酶抑制劑 (AI) 方便嗎？
 是 否 我不清楚
- 2 芳香環酶抑制劑 (AI) 藥效較法洛德注射液 (Fulvestrant) 短嗎？
 是 否 我不清楚
- 3 骨骼轉移之患者接受法洛德注射液 (Fulvestrant) 治療，在療效方面較芳香環酶抑制劑 (AI) 佳？
 是 否 我不清楚
- 4 芳香環酶抑制劑 (AI) 在藥物副作用方面，較接受法洛德注射液 (Fulvestrant) 多？
 是 否 我不清楚
- 5 接受法洛德注射液 (Fulvestrant) 存活率、復發率及臨床效益方面都較芳香環酶抑制劑 (AI) 佳？
 是 否 我不清楚



以上勾選，若任何一題回答為「不清楚」，請告知醫護人員並要求再次說明




步驟5 | 經過以上的仔細勾選， 您決定好了嗎？

經過前面的幾個步驟，您已經花了一些時間去瞭解抗賀爾蒙藥物的差異，以及自己心裡面所在意的影響因素了，現在您是否已經決定好了您想要接受的治療方式了呢？


所以我決定接受

- 芳香環酶抑制劑 (AI)
- 法洛德注射液 (Fulvestrant)



我仍然無法決定要何種治療方式

- 想再與我的主治醫師討論
- 想再尋求第二專家意見
- 想與我的家人再討論
- 對於以上的治療方式，我還想要瞭解更多，我的問題有：





完成以上所有的評估內容後，請您可以帶著這份結果回到門診或病房與您的主治醫師共同討論適合您的治療方式。

台中慈濟乳房醫學中心 關心您





台中慈濟醫院 乳房醫學中心

增加病患治療多樣性、延續性，且對於
延長總體存活期有潛在好處的抗荷爾蒙
治療是台灣乳癌病患所急需的。

